

Inarin Lapin lintulajit

Havaintoalueena Inarin Lapin luonnonmaantieteellinen alue, joka käsittää Inarin ja Utsjoen kunnat

Alueella on havaittu yhteensä 281 lajia 31.12.2022 mennessä.

Käytetyt lyhenteet:

yp = yleinen pesimälintu

hhp = hyvin harvinainen pesimälintu

myp = melko yleinen pesimälintu

ss = satunnainen, mutta vuosittain tavattava (suluissa havaintojen määrä)

mhp = melko harvinainen pesimälintu

s = satunnainen (suluissa havaintojen määrä)

hp = harvinainen pesimälintu

	273	240	
LAJI	Inari	Utsjoki	Lisätietoja ja lajin esiintymispaikkoja
Kyhmyjoutsen	s(2)	s(5)	Kyhmyjoutsen on viimeksi tavattu Utsjoella ja Inarissa, v. 1990 (mahdollisesti sama yksilö) ja v. 1991 Utsjoella Kaldoaivin erämaassa, Pigijärvellä.
Pikkujoutsen	s(2)		16–21.5.1977 1 Inari, Kettukoskenniska. 24.5.1993 2 Inarijärvi, Nanguvuono. *29.3.2022 1 p Inari, Kettukoski.
Laulujoutsen	mhp	hp	Laulujoutsenen koko Suomen pesimäkanta on kasvanut kovaa vauhtia ja laji on levittäytynyt pohjoisesta maan eteläosiin asti. Kevät- ja syysmuutolla suurimmat kertymät Inarissa tavataan Matkajoki-Solojärvi (> 100 yks.), Riutula-Kettukoski ja Toivoniemi-Kaamasjokisuu alueilla.
Metsähanhi	mhp	mhp	Pesimäkanta on huolestuttavasti taantunut 2000-luvulla. Kevätmuutolla tärkeimmät lepäilyalueet ja niillä havaitut suurimmat määrät: Utsjoki, Välimaa (Sirman pellot Norjan puolella) 18.5.2008 650, 17.5.2020 476, Nuvvus, Teppanansaari 14.5.2012 156, Inari, Kaamasjokisuu 30.4.2016 170. Syysmuutolla suurimmat muuttotarvet: 5.9.2018 160 SW Mellanaapa, 7.9.2007 150 S Ivalojoisuu, 27.9.2007 115 Siggavuono.
Lyhytnokkahanhi	ss	ss	Inarissa vuosittain muutamia yksilöitä kevätmuutolla, yleensä metsähanhien seurassa. Utsjoen "hanhipelloilla" lyhytnokkahanhea tavataan enemmän; suurin määrä Teppanansaassa 17.5.2021 12, Sirman pelloilla 15.5.2014 10 yksilöä. Syysmuutolla harvinainen, suurin määrä: 20.9.2012 38 m S Pulmankijärvi
Tundrahanhi	s	s	Lyhytnokkahanhea harvinaisempi. Utsjoen Sirman pelloilla enimmillään 5 yks. (13.5.2013) ja Teppanansaassa 5 yks. (18.5.2021).
Kiljuhanhi	s	ss	Viimeinen varmistettu pesintä on Suomen puolella todettu vuonna 1995 Kaldoaivin erämaassa. Pesii Norjan Ruijassa, jonka pienessä kannassa on näkynyt viime vuosina elpymisen merkkejä. Kevätmuutolla säännöllisesti muutamia yksilöitä Tenojokivarren "hanhipelloilla".
Merihanhi	ss	ss	Vuoteen 1999 mennessä merihanhesta oli tiedossa vain 4 havaintoa Inarin Lapista. Sen jälkeen 2000-luvulla havainnot ovat moninkertaistuneet. Suurimmat parvet: 29.9.2017 60 muuttolennossa Ivalo. 29.4.2018 29 p Riutula. 27.8.2015 24 p Menesjärvi, 11.9.2021 20 Mellanaapa. 21.5.2012 13 p Utsjoki, Sirman pellot.
Tiibetinhani	s(4)	s(10)	Tarhakarkulaisia tai karkulaisista syntyneiden populaatioiden jälkeläisiä. Utsjoen viimeisimmät havainnot Tenojokivarresta Kaavan rantapelloilta kesäkuussa 2006, 2008 ja 2009. Inarin viimeisimmät havainnot Juutuanvuonolta, kesäkuussa 2016 ja 2020.

Kanadanhanhi	s(21)	s(7)	Utsjoen havainnot: 30.4.1985 1 Kenesjärvi. 7.5.1992 5 m W Niemelä. 21.6.2005 3 W Alaköngäs. 19.–22.5.2017 1 Sirman pellot. Teppanansaari 12.–28.5.2018 1, 9.–14.5.2019 1 ja 21.–24.5.2020 1.
Valkoposkihanhi	s	s	Suurimmat parvet: 3.10.2016 50 m Inari, Hirvaspää, 30.8.2011 45 m SE Mellanaapa, 9.9.2021 30 m SW Ivalo, Rajankangas, 27.5.2010 12 p Utsjoki, Sirman pellot.
Sepelhanhi	s(11)	s(4)	Utsjoen havainnot: 17.5.1978 1 Kevojoki. 9.6.1996 Mieraslompolo. 3.6.2011 1 Karigasniemi. 7.6.2000 5 m N Karigasniemen Ailikkaan erotusaita. Suurimmat määrät: 18.10.1987 250 m Sarmitunturin erämaa, 24.10.1987 70 S Ivalo, 10.–12.10.2020 29 p Joensuuselkä.
Ruostesorsa	s(2)		*3.–7.8.1995 1 ad Vastusjärvi. *23.–29.8.2019 2 p Ivalo.
Ristisorsa	s(9)	s(6)	Pesii lähimmillään Ruijassa Jäämeren rannalla.
Mandariinisorsa	s(4)		*15.5.–31.7.1986 2 k Kettujoki. 12.4–8.5.2003 1 k Kettujoki. *30.4.–2.6.2013 1 k Ivalon Mellanaapa. 29.6.2016 1 k Muddusjärvi (valokuvattu).
Haapana	myp/mhp	myp/mhp	Suurimmat määrät: 28.9.2020 362 p Inarijärvi, Joensuuselkä, 17.6.2022 100 p Utsjoki, Dalvadas, 24.6.1998 91 p Ivalojoen suisto, 4.9.2004 60 p Kevon luonnonpuisto, Vuogojävi.
Amerikanhaapana	s(1)		*23.5.2001 1 k Ivalojoen suisto.
Harmaasorsa	ss/hhp	s(7)	Inarissa tavattu useimmiten Ivalojoen ja Kaamasjoen suistoalueilla. Pesintä varmistettu kerran Inarissa, Joutilasjärvellä v. 1984. Utsjoen havainnot (2003, 2007, 2010, 2012) Nuvvuksen Teppanansaaresta, (2017, 2020) Sirman pelloilta ja (2021) Basijavrilta.
Tavi	myp	myp	Suurimmat määrät kevätmuutolla: 22.5.2014 129 ja 24.5.2008 100 Ivalojoen suisto. Syysmuutolla: 24.8.2002 200 Nauramajänkä, 19.9.2012 180 Harjuntausjärvi.*Tavi × amerikantavi 26.5.2019 1k Utsjoki Sulaoja.
Sinisorsa	myp/mhp	mhp	Kevätmuutolla suurimmat kertymät: 29.4.2007 49 Ivalo, Sahanperä, 14.6.2006 40 Toivoniemi. Syysmuutolla: 5.10.2011 52 Harjuntausjärvi, 27.9.2015 46 Riutula, Leutolahti-Kettujoki.
Jouhisorsa	hp	mhp	Jouhisorsan pohjoinen kanta on taantunut 2000-luvulla. Esim. Ivalojoen suistossa määrät ovat kevätmuutolla pudonneet alle puoleen 1980- ja 1990-lukujen määristä. Tuolloin tavattiin säännöllisesti 20–40 yksilön parvia, 2000-luvulla ei koskaan näin suuria parvia, vain kerran 15 yksilön parvi. Utsjoella määrät eivät ole yhtä jyrkästi laskeneet: esim. 18.5.2019 30 Teppanansaari, 25.5.2020 36 Sirman pellot.
Heinätavi	hhp	s	Ivalojoen suistoalue on heinätavin pohjoisin säännöllinen esiintymispaikka Suomessa. Sieltä on pesimähavaintoja (1–3 paria) jo 1970-luvulta alkaen. Viime vuosina Suomen kanta näyttää hiipuneen.
Lapasorsa	hhp	s/hhp	Muutama pari pesii säännöllisesti Ivalojoen suistoalueella. Lintuatlaksissa lapasorsaa ei havaittu Utsjoen ruuduilla. Pesintä on Utsjoella kuitenkin varmistettu kaksi kertaa: 11.8.2001 n + 5 poikasta Paistunturin erämaa, Pasijavri ja 11.7.2015 n + 5 poikasta Mantojärvi.
Punasotka	s(25)	s(7)	Yhtä lukuunottamatta kaikki havainnot koskevat koirasyksilöitä: 14.6.2020 3k1n Utsjoki, Teppanansaari.
Tukkasotka	myp	mhp	Suurimmat määrät kevätmuutolla: 23.5.2020 149 Toivoniemi, Kaamasjoki, 15.–17.5.2018 129 Ivalojokisuu.
Lapasotka	hhp	hhp	Tunturi-Lapin erittäin harvalukuinen pesimälintu, joka kanta on taantunut jo 1970-luvulta lähtien. Vuoden 2010 uhanalaisluokituksessa laji nostettiin jo luokkaan "erittäin uhanalainen". Kevätmuutolla, toukokuun lopulla, muutaman yksilön voi todennäköisimmin tavata Inarijärven Joensuuselällä, Haipanpalon Harjujärvellä, Vaskojoen Tirrolahdessa ja Utsjoen Piesjärvellä, usein mustalintujen ja pilkkasiipien seurassa. Suurin määrä syysmuutolla 13.10.2020 33 yks Inarijärvi, Joensuuselkä.
Haahka	s(7)	s(2)	Vuosina 2000–2022 haahka on tavattu Inarin Lapissa vain kolme kertaa, vaikka sen pesimäalueet ovat lähimmillään muutaman kymmenen kilometrin päässä Varanginvuonolla. Viimeisin havainto 24.5.2014 kn Ivalojoessa Hotelli Ivalon kohdalla.
Kyhmyhaahka	s(3)	s(1)	Kyhmyhaahkasta tiedetään vanhat havainnot Inarin Lapista ennen vuotta 1831 ja Inarijärveltä 1890. Lisäksi 2.7.1985 1 jp k Nuorgam, Tenojoki ja *31.10.1985 1 1kv k Sevettijärvi.
Alli	hp	mhp	Tunturi-Lapin pesimälaji, jonka kanta painottuu Utsjoelle, Kaldovin erämaa-alueelle, missä paikoin melko yleinen. Tavataan yleisesti esim. Pulmankijärven tien varrella olevissa pikkujärvissä. Syysmuutolla varmimmin löydetävissä syys-loka-(marraskuussa) Inarijärven Juutuanvuonolta ja Muddusjärveltä (Riutula).
Mustalintu	mhp	myp/mhp	Tihein kanta Utsjoen itäosan tunturialueilla, jossa allin ohella paikoin melko yleinen. Tavataan harvakseltaan myös mäntymetsävyöhykkeellä. Kevät- ja syysmuutolla suurimpia parvia Juutuanvuonolla (esim. 31.10.2013 75 p), Muddusjärvellä (Riutula) ja Solojärvellä.
Pilkkasiipi	mhp	mhp/hp	Tihein kanta tunturikoivuhyöhykkeellä ja männyn metsänrajavyöhykkeellä. Muutolla suurimmissa parvissa on ollut 30–40 yks.

Pilkkaniska	s(5)	s(1)	*30.5.2008 2 k Vaskojoki, Junnas. *2.6.2010 1 k Harjuntausjärvi. *10.6.2012 1 k Kaamasentie. *30.5.2016 1 k Utsjoki, Pulmankijärvi. *30.5.-5.6.2022 1 k Konesniemi, Joensuu. Lisäksi mainitaan tavatun Inarissa 1841: Malm, A. W. 1845: Ornithologiska bidrag till skandinavisk fauna, samlade i det nordligaste Skandinavien från den 24. jan. 1841 till den 26. juli 1842. - Naturhistorisk Tidsskrift (2) 1: 180-212.
Telkkä	yp	myp	Kevätmuutolla suurimmat kertymät tavattu Ivalojokisuulla, esim. 5.6.2019 159, 29.5.2020 81 ja 16.5.2015 80.
Uivelo	myp/mhp	hhp	Pesimäaikaan laji on Inarin Lapin alueella runsaslukuisin Sevetintien varren pienissä järvissä ja lammissa. Suurimmat kertymät kevätmuutolla (enimmillään 30 yksilöä) tavattu Kaamasen Toivoniemessä (Vastusjärvi-Kaamasjoki) ja Ivalojokisuulla. Syysmuutolla ennätykselliset 73 yksilöä Väylän Tuolpujärvillä 11.9.2020.
Tukkakoskelo	myp/mhp	myp/mhp	
Isokoskelo	mhp	mhp	Syysmuutolla isokoskeloilla on tapana kerääntyä suuriksi parviksi kalanpyyntiin tietyille järville: esim. Menesjärvellä 12.10.2008 460. 7.10.2018 872 Syysjärvi.
Viiräinen	s(1)		27.10.1988 1 k Inarijärvi, Katsomasaari. Löytyi nälkiintyneenä lumihangelta.
Pyy	mhp	s(2)	Kanta on tihein Ivalon itäpuolisella alueella. Pohjoisessa harva kanta ulottuu Kaamaseen asti, lännessä Lemmenjoen kansallispuistosta muutamia pesintään viittaavia havaintoja. Utsjoelta on vanha kirkkoherra Jacob Fellmanin 1906 mainitsema tieto. Tämän jälkeen Utsjoelta on tiedossa vain yksi havainto (2015 1 Å Alaköngäs).
Riekko	yp	yp	Riekon vuosittaiset kannanvaihtelut ovat suuria. Lajille tyypillistä on, että onnistuneen pesintäkauden jälkeen linnut alkavat syystalvella kerääntyä jopa satapäisiksi parviksi. Ennemmin tai myöhemmin kanta taas romahtaa.
Kiiruna	mhp	mhp	Lajin tunnetuimmat esiintymispaikat Inarissa ovat Kilopää, Saariselän lisakkipää ja Urupää. Utsjoella Karigasniemen Ailikas, Nuvvos-Äilegas, Njallavärri, Kaktavaara ja Čuomasvärri (Tsuomasvaara). Viime mainitulta on tieto ennätysuurista yli sadan yksilön parvista vuosina 1987 ja 1989.
Teeri	hp	s/hhp	Inarissa kanta painottuu kunnan etelä- (Kutturantien ympäristö) ja itäosiin (Sulkusjärven ympäristö, Rajajoosen tien ympäristö). Utsjoelta on tiedossa muutamia vanhempia julkaistuja havaintoja, mutta 2000-luvulta ainostaan yksi: pesintä varmistettiin viimeisimmässä lintuataksessa Pulmankijärven ruudussa 776:53 (pesimävarmuus 73)!
Metso	myp/mhp	hhp	Utsjoen kanta hyvin harva, jokivarsien (Inarijoki, Tenojoki ja Utsjoki) männiköissä.
Fasaani	s		Kanakoerien koulutusta varten tuotuja nähty 1990-luvulla muutaman kerran.
Kaakkuri	mhp	mhp	Iijärven alueen kaakkurikanta on Suomen tiheimpiä. Järvellä on loppukesällä tavattu jopa 30 aikuista lintua kalan pyynnissä. Linnut pesivät ympäristön pienillä suolammilla ja järvillä. Kaakkurin suosimia alueita ovat lisäksi Inarijärvi, Vätsärin erämaan pohjoisosan järvet, Muddusjärvi ja Pulmankijärvi.
Kuikka	myp/mhp	myp/mhp	Suurimmat tavatut kertymät: 21.5.2000 36 p Inari, Solojärvi, 19.5.2007 30 p Inari, Juutuanvuono.
Amerikanjääkuikka	s(8)	s(3)	Inari: Taimenjärvi (*1932), Suomen ensihavainto lajista, Muddusjärvi (*1986 ja *1994), Inarijärvi (*1986, 2010, 2012), Menesjärvi (*2000), Paatsvuono (*2000). *12.10.2021 +1kv tp, Juutuanvuono. Utsjoki: Kevojärvi (*1998), Pulmankijärvi (2007, 2008).
Jääkuikka	s(4)	s(2)	*11.10.1979 1 Inarijärvi. *7.11.1985 1 kv Sevetijärvi. *20.10.1986 1 +2kv Inarijärvi. 4.11.2004 1 juv SW Inarijärvi, Pielpavuonon suu. 13.6.2005 1 p Utsjoki, Vuolit Cuokkajavri. *8.7.2008 1 jp p Utsjoki Pulmankijärvi. *26.1.2021 1 2kv Angeli. .
Pikku-uikku	s(4)	s(1)	7.8.1986 1 Teppanakotajärvi. 4.11.1989 1 Inarin kirkonkylä, kalasatama. 12.–13.11.1989 1 Utsjoki Mieraslompola. 18.11.1990 1 otettu kiinni Inarijoen sulasta ja toimitettu Ranuan eläinpuistoon. 26.5.2015 1 Solojärvi.
Silkkiuikku	s(7)		24.–26.5.1988 1 ja 23.–26.5.1992 1 Ivalojokisu. 23.10.2008 2 tp Solojärvi. 21.6.2000 1 Kaamasjoen suisto. 11.6.2005 1 Inarijärvi, Juutuanvuono. 19.6.2020 1 Ivalojokisu. 16.7.2020 1 Inarijärvi, Joensuu. Lisäksi.
Härkälintu	s(16)	s(2)	Utsjoen havainnot Pulmankijärveltä (1990) ja Luomusjärveltä (2015).
Mustakurkku-uikku	s(12)/hhp	s(7)	Pesii harvinaisena Ruijassa. Suomessa säännöllinen levinneisyys ulottuu eteläisimpään Lappiin asti. Yritti pesintää Inarissa vuonna 2016 Ukonjärvellä, mutta munapesä tuhoutui.
Myrskylintu	s(2)	s(7)	2000-luvulta kaksi havaintoa: *17.5.2001 1 Utsjoki Vetsikko, Välimaa ja *7.7.2008 1 Utsjoki, Pulmankijärventie.
Suula	s(1)		*24.6.2014 1 kuolleena löydetty, 3-4kv, Tolosjoki, Katajaoja.

Merimetso	ss	ss	Säännöllinen kesä- ja syysvieras Inarijärvellä. Tavatut yksilöt yleensä nuoria. Järven tunnetuin merimetsojen kerääntymis- ja lepäilypaikka on Kasariselän Laukkukari. Syksyllä 2000, jolloin merimetsoja oleskeli Inarijärvellä ennätysmäisen paljon, Laukkukarilla tavattiin jopa yli 100 lepäilijää. Merimetsojen läpimuuttoa Jäämerelle havaitaan huhtikuussa ja paluumuuttoa elo-syyskuun taitteessa. Muuttoparvissa voi olla useita kymmeniä yksilöitä.
Kaulushaikara	s(1)		22.9.1997 1 Hammastunturin erämaa, Tupajänkä.
Silkkihaikara	s(1)		*1.6.1998 1 Inari, Ivalojoensuu.
Jalohaikara	s(5)	s(2)	*21.6.1979 1 Menesjärvi. *1.5.1990 1 Utsjoki Niemelä. *21.6.2016 1 p Ivalojoensuu, Juurakkovuopaja. *29.3.-4.4.2021 1 Utsjoki, Basejavri, Sulaoja. *17.5.2021 1 Riutula, Leutolahti. *17.6.2021 1 p Ivalojoensuu, Juurakkovuopaja. *25.10.2021 1 Solojärvi.
Harmaahaikara	ss(>50)	s(16)	Harmaahaikara on ollut Suomessa hyvin harvalukuinen pesijä aina 1980-luvulle asti. Sen jälkeen laji on runsastunut. Osa Inarin Lapissa havaituista voi olla lähtöisin myös Norjasta. Vuonna 2019 Inarin Lapissa 8 havaintoa, 2020 4 havaintoa, 2021 ei havaittu, 2022 2 havaintoa.
Kattohaikara	s(1)	s(1)	26.-27.5.1979 1 Utsjoki, Outakoski. 10.6.1990 1 Solojärvi, Illestijoki ja 13.-21.6.1990 1 Kaamasjoen suistoalue. Kaksi viimeisintä havaintoa koskevat todennäköisesti samaa yksilöä.
Mehiläishaukka	s(4)	s(2)	5.8.1975 2 Utsjoki, Yläköngäs. 3.6.1989 1 Mielikköjänpää. 10.7.1990 1 Utsjoki, Kevo. 4.7.1999 1 Ivalo, Kuusiniemi. 18.7.1999 1 Ivalo, Pikku-Petsamo. 30.8.-1.9.2022 1 ad n Mellanaapa.
Haarahaukka	ss(>30)	s(4)	Haarahaukka on kerran (2006) yrittänyt pesintää Inarissa, Sarmijärvellä. Vuonna 2019 Inarissa yksi havainto, 2020 kuusi. Utsjoen havainnot: 4.6.1966 1 W Karigasniemen Pasijohka. 15.7.1990 1 Tsarsejohka. 12.7.1992 1 Rovisuvanto-Outakoski. 12.6.2021 1 Junttejohka.
Merikotka	hhp	ss	Inarin pesimäkanta yhteensä 7-8 paria.
Pikkukorppikotka	s(1)		*3.8.1962 1 3 kv Ivalo, vanha kaatopaikka. Lintu ammuttiin ja on täytetty. Suomen ensihavainto lajista.
Ruskosuohaukka	ss	s(4)	Inarin Lapista oli vuoteen 1999 mennessä ilmoitettu vain kolme ruskosuohaukahavaintoa. Vuosina 2000-2022 ilmoitettiin yhteensä 62 havaintoa, joista 4 Utsjoelta. Useimmat havainnoista Ivalojoen ja Kaamasjoen suistoalueilta sekä Nauramajängältä. 2022 Mellanaavalla pesintään viittavia havaintoja. Utsjoen havainnot: 15.8.2011 1 n Cuoggä. 20.9.2012 1 1kv m N Pulmankijärvi. 22.6.2020 1 ad n Luopmosjohjeaggi. 23.6.2020 1 k Piesjänpää.
Sinisuohaukka	hp/hhp	hhp	Esiintymisen runsaus vaihtelee ravintotilanteen mukaan. 2018 Inari 5 havaintoa, Utsjoki 1, 2019 Inari 15, Utsjoki 2, 2020 (kohtalainen myyrävuosi) Inari 34, Utsjoki 13. 2022 (myyräkatu) Inari 10, Utsjoki 2.
Arosuohaukka	s(18)	s(5)	Utsjoen havainnot: 26.6.2007 1 k Mierasjärvi. 28.6.2012 1 n Nuvvos, Álegas. 6.6.2014 1 k kiert Karigasniemi, Ailikas. 7.6.2020 1 2 kv Luopmosjohjeaggi. 14.6.2020 +2kv k Gistatbelvuobmi .
Niittysuohaukka		s(1)	18.5.2011 1 ad k N Utsjoki, Pulmankijärvi.
Kanahaukka	mhp	hhp	Lintuatlaksessa 1974-79 ja 1986-89 pesintä varmistettiin Utsjoella neljässä ruudussa mäntymetsien alueella, mutta viimeisimmässä atlaksessa 2006-2010 pesintöjä ei todettu. Utsjoelta Tiiraan on ilmoitettu 2000-luvulla vuosittain 1 - 4 havaintoa.
Varpushaukka	hp	ss	Tavataan yleisimmin Inarissa Ivalon ympäristössä, jossa myös pesintä on varmistettu muutaman kerran. Utsjoelta Tiiraan on ilmoitettu 2000-luvulla vuosittain 1 - 3 havaintoa.
Hiirihaukka	s(31)	s(9)	
Piekana	myp	myp	Suurimmat määrät muutolla: 26.4.1986 96 m Utsjoki, Kevo, 23.4.2019 41 m Mellanaapa. Myyrähuippuvuotena 1987 tutkijat rengastivat Inarin Lapin alueelta yhteensä 558 piekanan poikasta 165 pesästä.
Maakotka	hp	hp	Inarin ja Utsjoen pesimäkanta 70-80 paria.
Arokotka	s(2)	s(2)	*28.-30.5.1980 1 2-3 kv Ivalo. *19.7.1988 1 2-3 kv Utsjoki, Kaldoaivin erämaa, Puksajärvi. *8.10.2001 1 2 kv Inari, Tirro. 20.6.-12.7.2003 1 nuoruuspukuinen Utsjoki, Kaldoaivin erämaa.
Sääksi	hp	hp	
Tuulihaukka	mhp	mhp	

Punajalkahaukka	s(2)		14.6.2005 1 n p Inari, Mielikköjärvi. Vuoden 2022 elokuun lopun lämpöaallon seurauksena eteläisemmässä Suomessa havaittiin ennätysellinen määrä, jopa 1600 punajalkahaukkaa, enimmillään yli 20 linnun parvissa. Lappiin asti ei vaellus juurikaan ylettnyt, vain kaksi havaintoa kirjattiin, joista toinen Inarista: *27.8.2022 1 kv p Nauramajänkä.
Ampuhaukka	mhp	mhp	
Nuolihaukka	s(28)	s(7)	Lintuatlas 2006–2010: Inarissa varmistettu pesintä Kaamasjoen suiston ruudussa 766:350, pesimävarmuus 70.
Tunturihaukka	hhp	hhp	Inarin ja Utsjoen pesimäkanta 15–30 paria.
Muuttohaukka	hhp	hhp	Inarin ja Utsjoen pesimäkanta 20–25 paria.
Luhtakana	s(2)		*7.4.2016 1 löytyi kuolleena tieltä Inari, Akujärvi. 13.5.2016 1 Ivalo, Näverniemen pellot.
Luhtahuitti	s(1)		17.6.2006 1 Ä Ivalo, Jänkkäjärvi.
Liejukana	s(4)	s(1)	14.11.1981 1 Inari, Nellim. 31.3–5.4.2001 1 Utsjoki, Karigasniemi. 14.–22.4.2009 1 Inari, Saariselkä. 12.–14.4.2012 1 p Inari, Kiilopään tunturikeskus. 8.–10.9.2014 1 juv Inari, Mellanaapa.
Nokikana	s(9)	s(4)	Utsjoen havainnot: 6.-n.30.5.1989 1 Kevojärvi, Kevonsuu. 2.6.2002 1 Mantojärvi. 10.-16.5.2005 1 Utsjoki kirkonkylä. 4.8.2007 1 Piesjänpää.
Kurki	mhp	hhp	Suomen kurkikanta on ollut koko 2000-luvun voimakkaassa kasvussa, samoin Inarin Lapin. Suurimmat määrät esim. Mellanaavalla: 30.4.2008 32 p, 11.5.2017 53 p, 1.5.2020 96 p, 3.5.2022 70 p. Pohjoisimmat pesinnät on varmistettu Inarin pohjoisosissa Kiesvaaranjänpää-Sammuttijänkä- soidensuojelualueella, Pieran Marin jänpään soidensuojelualueella ja Utsjoella kunnan eteläosassa ruudussa 771:352 Johtijärvi sekä Luopmosjohjeagilla. Viime vuosina myös Utsjoen Piesjänpäältä on pesimiseen viittaavia havaintoja.
Pikkutrappi		s(1)	Mainitaan ammutun 1795 Utsjoella: Grape, E. J. 1804: Utkast till beskrifning öfver Enontekis sokn i Torneå lappmark. Om djur och växter. - Kungliga Vetenskaps Academin Nya Handlingar 1804: 85-102. Suomen ensihavainto.
Avosetti	s(1)		*Toukokuu 1991 1 Inari, Sarmitunturin Lauttaselkä.
Meriharakka	ss	ss	Vuosittain muutamia havaintoja lähinnä kevätmuutolla. Suurimmat määrät: 29.5.2010 12 p Utsjoki, Kirkonkylä, Tenojoki, 3.8.2013 20 lepäilijää Inarijärvi, Palkissaari.
Kapustarinta	myp/mhp	yp/myp	
Tundrakurmitsa	s(17)	s(13)	Havainnot jakautuvat melko tasaisesti kevät- ja syysmuuttokausille. Suurin määrä: 16.8.2022 16 ad ja 3 juv p Inari, Joutilasjärvi.
Töyhtöhyppä	hhp	s	Ensimmäisissä lintuatlaksissa 1974–79 ja 1986–89 töyhtöhyppä pesintä varmistettiin Inarissa 6 ruudulla, viimeisimmässä atlaksessa 2006–2010 enää vain yhdellä ruudulla (Mielikköjänpää-Mellanaapa). Myös vuonna 2022 kaikki havainnot keskittyivät tälle ruudulle ja Mellanaavalle, jossa pesi muutama pari. Utsjoella harvinainen vierailija. Suurin määrä: 30.4.2019 15 p Mellanaapa.
Pikkutylli	s(8)	s(1)	10.6.1988 1 Inarin kirkonkylä. Vuosien 1986–89 lintuatlaksessa mahdollinen pesintä Ivalojokisuun ruudussa 763:52. 21.5.1995 1 kn Ivalo, Pikku-Petsamon rantapellot. 2.6.2000 1 Tiivivaara. 27.6.2009 1 Kaldoaivin erämaa, Vuontislompelo. 20.7.2010 1 Ivalo, Pikku-Petsamo, Ravirata. 26.7.2017 1 hätäilevä soranottoalueella Utsjoki, Luomusjoen kuolpuna. 30.6.2018 2 Mellanaapa. 9.7.2018 2 Näätäjänpää. Ensimmäinen pesintä alueella 18.6.–28.7.2020 2 ad ja 2 juv Inarin kirkonkylä.
Tylli	mhp	myp	Tihein kanta Utsjoen tunturialueiden soilla.
Keräkurmitsa	hp	hp/mhp	Tunnetuin esiintymispaikka Inarissa on Saariselän Kaunispää, jossa keräkurmitsa on pesinyt melko säännöllisesti. Utsjoella varmimmat esiintymispaikat ovat Karigasniemen Ailikas ja Utsjoen Äilegas-Puollamoavi sekä Kaksavarri.
Pikkukuovi	myp	myp	
Kuovi	hhp	s(<10)	Inarin Lapissa lajin tiedetään pesivän (vuosittain 2–4 paria) vain Ivalojoen suistoalueella. Pesimiseen viittaavia havaintoja on Kaamasjoen suistoalueelta ja Mellanaavalla. Utsjoelta on 2000-luvulta (2000–2018) tiedossa vain neljä havaintoa.
Mustapyrstökuiri	s(4)	s(1)	14.6.1976 3 Utsjoki, Rohtojärvi. 13.4.1991 1 p Ivalo, Kyrönpuoli. 26.5.2006 1 p Ivalo, Mellanaapa. 16.5.2019 1 p Ivalojokisuun. 23.5.2022 2 p, joista toinen *alalaji islandica, Ivalojokisuun, Juurakkovuopaja.
Punakuiri	hp	mhp	Punakuirin Suomen pesimäkanta painottuu Utsjoen Kaldoaivin ja Paistunturin erämaa-alueille. Inarissa pieni kanta Vätsärin erämaan pohjoisissa ja Lemmenjoen kansallispuistossa. Kevätmuutolla punakuirin tapaa varmimmin Karigasniemen Ailikkaan poroerotuspaikalla toukokuun loppupuolella, missä joskus jopa useamman kymmenen yksilön muuttoparvia.

Karikukko	s(>20)	s(6)	1–2 paria on pesinyt Inarijärven Lintusaarissa vuosina 1986-87.
Isosirri	s(10)	s(5)	Kaikki havainnot yhtä lukuunottamatta (19.8.2022 12 m S Inari, Aviosaalet) kevätmuutolta, enin osa välillä 17.-23.5.
Suokukko	mhp	myp	Suurimmat määrät: 31.5.2020 300 p Ivalojoensuu. 15.5.2018 200 p Mellanaapa.
Jänkäsirriäinen	mhp	hp	Metsä-Lapin aapasoiden tyyppilaji. Inarin Lapin alueella tihein kanta Lemmenjoen kansallispuiston suurilla soilla. Pohjoisessa levinneisyys ulottuu Tunturi-Lapin eteläosiin, missä pesivänä esim. Utsjoen Piesjängällä ja Kariganiemen tien varren Luopmošjohjeagilla.
Kuovisirri	s(6)	s(1)	Inarin viimeisin havainto 28.5.1998 1 Väylä, Tuolpujärvet. Utsjoki 13.8.2019 10 m Buolbmajávri (Pulmankijärvi).
Lapinsirri	hp	mhp	Kanta painottuu Utsjoen tunturialueille ja Inarin kunnan pohjoisosissa sijaitseville suurille suoalueille. Mäntymetsävyöhykkeellä harvinainen pesimälintu.
Pulmussirri	s(5)	s(4)	Kaksi viimeisintä havaintoa: 25.7.2019 22 Inari, Solojärvi, Ahkioniemi. 9.6.2015 10 Utsjoki Nivajoki.
Suosirri	hp	mhp	Tunturisoiden pesimälintu Utsjoella Paistunturin ja Kaldoaivin erämaa-alueilla. Inarin puolella pieni kanta painottuu kunnan pohjoisosan suurille soille, Pieran Marin jängälle, Kiesvaaran jängälle ja Sammuittijängälle. Kevätmuutolla lajin löytää varmimmin Karigasniemen Ailikkaan erotuspaikan lähistöltä toukokuun loppupuolella. Suurin määrä: 20.5.2022 100 p Ivalojoensuu, Juurakkovuopaja.
Merisirri	s(10)	s(6)	Keväthavaintoja (huhti-kesäkuu) 5, näistä pesintään ehkä viittaava 7.–8.6.1990 1–2 Utsjoki, Kaldoaivin erämaa, Čarajávrrit (Tsaarajärvi). Syyshavaintoja (syys-lokakuu) 3, talvihavaintoja (marras-maaliskuu) 7, joista enin osa löydettyäessä kuolleita. Karigasniemen Pasijärvellä 6.2.-26.3.2022 viipynyt yksilö oli tiettävästi ensimmäinen koskaan bongattavissa ollut.
Pikkusirri	ss	s(<10)	Pesintä varmistettiin ensi kertaa Suomessa kesällä 1989 Inarin Lapissa, lähellä Norjan rajaa. Sitten pesintä varmistettiin samalla paikalla useita kertoja vuosina 1990-94.
Vesipääsky	hp	mhp	Tunturi-Lapin pesimälintu. Mäntymetsävyöhykkeellä hyvin harvalukuinen pesimälintu.
Isovesipääsky		s(2)	8.-9.6.1968 1 Utsjoki, Luopmošjohjeaggi. 7.6.2005 2 p Utsjoki, Mantojärvi, Hotelli Pohjan Tuli.
Rantakurvi	s(2)		7.6.1989 1 Inarin kirkonkylä, satama. 22.6.2002 1 Inarin kirkonkylä, Hotellin ranta.
Rantasipi	myp/mhp	myp/mhp	Viihtyy etenkin jokivesistöjen varsilla.
Metsäviklo	hp	s(<10)	Inarissa lajin säännöllisiä esiintymispaikkoja ovat Ivalojoenvarren kuusikot, Sarmitunturin erämaa (Sarmikuusikko) ja Lemmenjoen laakso (Härkäjärvi-Ravadasjärvi).
Mustaviklo	mhp	mhp	
Valkoviklo	myp	mhp	Valkoviklon kanta on tihein mäntymetsävyöhykkeellä. Tunturi-Lapissa harvalukuinen pesimälintu.
Lampiviklo	s(3)		17.–18.5.1992 1 Ivalo, Pikku-Petsamo. 30.5.2002 1 Kaamasjoen suisto, Toivoniemi. 26.–28.5.2018 1 Ivalo, Mukanperä.
Liro	myp/yp	myp/yp	Suoalueiden yleisin kahlaaja.
Punajalkaviklo	ss/hhp	hp	Tavataan Inarissa vuosittain kevätmuutolla, yleensä muutamia yksilöitä. Harvalukuinen pesimälintu Utsjoella Tenojoen laaksossa sekä Paistunturin ja Kaldoaivin erämaa-alueiden pohjoisosissa. Pesimiseen viittaavia havaintoja on myös Vätsärin erämaan pohjoisosista. Pesintä varmistettu kerran Inarijärvellä Partakonsaareissa.
Jänkäkurppa	mhp	mhp	Jänkäkurpan ääni kuuluu jokaisen vähänkin laajemman aapasuon keväiseen äänimaailmaan, esim. Ivalon Mellanaapa, Utsjoen Luopmošjohjeaggi ja Piesjängä.
Lehtokurppa	ss/hhp	s	Pieni kanta on syntynyt Pohjois-Lappiin viime vuosikymmeninä. Ivalossa ja lähiympäristössä on arviolta 5 - 10 reviiriä. Utsjoelta Tiiraan on kirjattu vain viisi havaintoa 2000-luvulla.
Taivaanvuohi	myp	myp	
Heinäkurppa	s(6)	s(6)	Pesintä varmistettu kaksi kertaa Utsjoella: 26.6.1949 3 juv Sávjajávri ja 20.7.1997 1 hätäilevä Kaldoaivin erämaa, Vetsijärven alue. Viime lintuataksessa 2006-2010 yhdessä ruudussa (Kaldoaivin erämaa) mahdollinen pesintä.
Leveäpyrstökihi	ss	ss	Vuonna 2012 poikkeuksellinen kesäkuinen esiintyminen, suurimmat parvet Utsjoen Ailikas 11.6.2012 24 lintua ja Čuomasvárri samana päivänä 19 lintua. *24.5.2016 30 muuttavan parvi Syysjärvellä ja *29.5.2018 12 Menesjärvellä. Syysmuutolla satunnaisvierailija Inarijärvellä, runsaslukuisempi vuosina 1985, 1991 ja 2014, useimmat lokakuussa, myöhäisimmät marraskuussa.

Merikihu	ss	ss	Leveäpyrstökihua yleisempi. Merikihuja havaitaan etenkin Inarijärvellä, mutta usein myös Utsjoen Pulmankijärvellä ja Kaldoaivin erämaassa.
Tunturikihu	hp	mhp	Pesii tunturialueilla. Myyrä- ja sopulivuosina yleinen. Saapuu toukokuun lopulla, jolloin tavataan yleisimmin Utsjoella, Karigasniemen Ailikkaan erotuspaikalla ja Piesjängällä sekä Pulmankijärven tien varren tunturiylängöllä. Kerääntyy Piesjängälle usein suuriksi parviksi. 3.6.2018 Piesjärvellä uimassa (söivät kuoriutuvia vesihyönteisiä) 145 tunturikihua.
Isokihu	s(3)	s(2)	*11.6.1993 1 NNW Pulmankijärven alue, Urroaivi. *19.6.2006 1 Inarijärvi, Vasikkaselkä. *18.6.2019 1 p Inari, Paadarjärvi. *15.6.2020 1 W/SW Paistunturin erämaa, Uhca Erttetvarri. *5.6.2022 1 Inari, Toivoniemi.
Lunni	s(4)	s(?)	Hyvin vanhojen Jacob Fellmanin tietojen (Utsjoki 1820–32) lisäksi vanhat havainnot joulukuulta 1902 Inarin Rökkijärveltä ja vuodelta 1963 Inarista. *5.1.1998 1 2kv Inari Törmänen. *20.2.2005 1 + 2kv Inarijärvi, Hirvinuora.
Riskilä	s(3)		Vanha tieto Inarista 1800-luvun alkupuolelta (Fellman). 22.10.1988 1 ad vp Inarijärvi, Ukonselkä. *2.2.2020 1 Inari kk.
Pikkuruokki	s(18)	s(3)	Havainnoista 7 Inarijärveltä, tavataan järvellä yleensä loka-marraskuussa.
Ruokki	s(2)		18.1.1976 1 Inari, Törmänen. 5.1.1987 1 Inari, kirkonkylä, löytyi tieltä.
Etelänkiisla	s(8)	s(2)	Jäämereltä harhautuneita, tielle tai jäälle laskeutuneita lintuja on löydetty joului-tammikuussa: 1958 (1 yks.), 1959 (1 yks.), 1979 (2 yks.), 1981 (1 yks.) ja 1986 (5 yks.)
Pohjankiisla	s(5)		Joulukuussa 1902- vuonna 1903 3 yksilöä Inarissa. *14.12.1986 1 juv Kaamanen, Aitajärvi. *13.7.2008 Inarijärvi, Vieppisaaret.
Räyskä	s(3)	s(2)	4.8.1968 1 S Utsjoen kirkonkylä. 20.6.1976 1 Kaldoaivin erämaa, Čarajávrrit. 30.7.2004 1 p Inari, Solojärvi. 4.7.2010 1 p Inarijärvi, Peuravuono. 2.6.2012 1 Solojärvi.
Mustatiira	s(1)		14.5.2003 1 ad Inari, Juutuanjokisuu.
Kalatiira	hhp	s(9)	Inarin kalatiirakanta asustelee Solojärvi-Paadarjärvi (Vaskojoki-Kettujoki) -alueella. Usein nähty myös Inarin kalasatamassa. Utsjoen ensimmäiset havainnot kalatiirasta tehtiin vuosien 1974-79 atlaskartoituksissa, johon ilmoitettiin havainnot kahdelta ruudulta.
Lapintiira	mhp	mhp	Laji on 2000 -luvulla kadonnut monilta vanhoilta pesimäpaikoilta; koskee mm. Inarijärven pesimäkolonioita.
Pikkulokki	hhp	hhp/s	Suurimmat Inarista ilmoitetut parvet: 26.5.2013 190 p Tuolpujätet, 2.6.2013 130 Kaamasjoen suisto, Toivoniemi, 11.6.2015 120 Ivalojoen suisto. Tämän jälkeen yksilömäärät ovat Inarissa lähteneet jyrkkään laskuun: vuonna 2019 suurin havaittu parvi 25 yks, 2020 13 yks, 2021 6 yks. ja 2022 11 yks. Utsjoella pikkulokin pesintä (10-15 paria) varmistettiin Tenojoen Tiirasaassa (Tshearreksuolu) v. 2015–2017.
Jäälokki	s(2)		Vanhat Elis Nordlingin ilmoittamat havainnot: 1888/1889 1 Inari, Paltoniemi ja 2.6.1891 1 Inari kk: Nordling, E. 1898: Fågelfaunan i Enare socken. - Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica 15(3): 1-93.
Pikkukajava	s	s	Alueelta on vanhoja havaintoja myrskyn ajamista suurista parvista, esim. 27.3.1894 Inarijärvellä havaitut 50–60 kajavaa ja 18.–19.3.1927 Kaamasessa havaitut "tuhannet" pikkukajavat. Vuosina 1985–1999 laji havaittiin 7 kertaa (kerran Inarissa, muut Utsjoella), 2000-luvulta on tiedossa 8 havaintoa (Utsjoki 3, Inari 5), joista yksi koskee suurta parvea: *22.4.2020 61 lennossa Tenojokilaaksoa pitkin koilliseen, Utsjoki kk.
Naurulokki	hp	s	Inarissa kevätmuutolla melko yleinen. Aiemmin pesimäyhdyksuntia muutamissa järvissä ja lammissa Inarissa. 2000-luvulla pesimähavaintoja on tehty hyvin vähän. Utsjoelta kirjattiin Tiiraan vain 1 havainto v. 2021 ja 2022.
Kalalokki	myp	myp	
Selkälokki	ss/hhp	s	Selkälokki pesii Pohjois-Norjassa, alalajit intermedius, ja vähentyneenä fuscus. Kuolan niemimaalla pesii alalaji heuglini. Selkälokin pesintä on varmistettu Inarin Lapissa vain 1892-1893, jolloin Inarijärveltä ilmoitettiin 3 pesälöytöä (Nordling, E. 1898: Fågelfaunan i Enare socken. - Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica 15(3): 1-93. Seuraava (todennäköistä) pesintää koskeva havainto on Inarijärveltä Naarassaaren ympäristöstä, jossa tavattiin 24.8.2018 kaksi aikuista selkälökkia (alalaji fuscus), ja näiden seurassa kaksi lentokykyistä nuorta lintua. Tämän jälkeen Nitsijärvellä varmistettiin 17.6. 2019 kaksi pesintää, joissa kummassakin ainakin toinen pariskunnan linnuista oli "tuhkaselkälokki". Ns. "tuhkaselkälökeista" (alalajit graellsii / intermedius / heuglini) tehdään vuosittain useita havaintoja Inarin Lapista, näistä useimmat Inarijärveltä. Oletettavasti enimmäkseen koskevat alalajia heuglini. Vuonna 2022 Inarijärvellä varmistettiin kahden tuhkaselkälökkiparin pesinnät.

Harmaalokki	ss/hhp	ss/hhp	Jäämeren läheisyyden vuoksi harmaalokkia tavataan yleisesti Tenojoella ja säännöllisesti myös Inarijärvellä. Pesimälintuna se on kuitenkin Inarin Lapissa hyvin harvinainen. Pesintä varmistettiin ensimmäisessä ja toisessa lintuatlaksessa yhteensä kolmella Inarijärven ruudulla, viimeisimmässä atlaksessa vain yhdellä Utsjoen ruudulla.
Isolokki	s(2)	s(7)	Inarin havainnot: 30.5.2000 1 2 kv p Vastusjärvi, Toivoniemi. *29.5.2022 1 ad Ivalojoensuu, Juurakkovuopaja.
Merilokki	ss/hhp	ss/hhp	Merilokin pesintää ei uusimmassa lintuatlaksessa 2006–2010 varmistettu Inarijärvellä, eikä koko Inarin Lapin alueelta. 1970- ja 80-lukujen atlaksissa pesimähavaintoja oli useilta paikoilta.
Kesykyhyhky	hp	s	Ivalossa ja Saariselällä pienet pesimäkannat. Ivaloon kesykyhyhky on tullut 1960-luvulla. Kanta on sen jälkeen vakiintunut; enimmillään yli 40 yksilön populaationa. Utsjoelta havaintoja yleensä vain yksittäisistä linnuista.
Uuttukyyhky	s(27)	s(1)	Utsjoen ainoa havainto: 16.05.2003 1 Teppanansaari, sepelkyyhkyjen (2) seurassa.
Sepelkyyhky	hp	ss/hhp	Pesii harvalukuisena, mutta säännöllisesti Ivalon ympäristön kuusimetsissä. Muualla Inarissa harvakseltaan. Utsjoella pesälöytö Karigasniemen seudulta 1990-luvulla, mistä myös useita pesimiseen viittaavia havaintoja 2000-luvulla. Suurin määrä: 14.-17.5.2020 80 p ruokinnalla Ivalo, Salmenranta ja samalla paikalla 1.5.2021 43 yksilöä ja 2.5.2022 44 yksilöä.
Turkinkyyhky	ss	s(13)	2000-luvulla laji on havaittu Inarissa 21 kertaa (21 yksilöä) ja Utsjoella 3 kertaa (4 yksilöä).
Turturikyyhky	s(13)	s(4)	Inarin viimeisin: Tirro ja Tulvalahti *11.9.-16.10.2019. Utsjoen viimeisin: 3.10.2000 1 törmäsi ikkunaan (kuoli), Mantokuolpuna.
Idänturturikyyhky	s(2)		*Streptopelia orientalis meena 9.-17.5.2020 1 p ruokinnalla Ivalo Salmenranta. *Streptopelia orientalis 9.-11.8.2020 1 Kaamanen
Käki	mhp	mhp	
Huuhkaja	hhp	s(1)	Huhuilevia kuultu Inarijärven eteläosan vaaramailla (Nanguniemi, Kankiniemi, Mahlatti), Vuontisjärven Korppivaarassa ja Muddusjärven Syrminiemessä. Utsjoelta Fellmanin vanhojen (1820–31) tietojen lisäksi vain yksi havainto, huhuileva 1990-luvulla.
Tunturipöllö	s	hhp	Pesinyt Utsjoen itä- ja länsiosien tunturialueilla ainakin vuosina 1974, 1987, 1988, 2007, 2011 ja 2015. Vuosien 1987-88 joukkopesintä (15–20 paria) oli poikkeuksellisen suuri Suomen oloissa.
Hiiripöllö	mhp	mhp	Hyvinä myyrävuosina runsaslukuinen ja päiväaktiivisena lajina näkyvä. Esim. vuonna 2011, hyvänä sopulivuonna, Tiira-havaintojärjestelmään kirjattiin Inarin ja Utsjoen alueelta 408 havaintoa yhteensä 579 yksilöstä! Ko. vuoden syksyllä Inarin Lapissa oleskeli ilmeisesti yhteensä useita tuhansia hiiripöllöjä.
Varpuspöllö	hp	s	Lintuatlaksessa 2006–2010 Inarissa varmistettiin pesintä yhdessä ruudussa. Tätä ennen varpuspöllön pesintöjä on ollut tiedossa muutama. Havaintojen määrät viime vuosina: 2020 Inari 9, Utsjoki 1. 2021 Inari 8, Utsjoki 1. 2022 Inari 11, Utsjoki 3.
Viirupöllö	s/hhp(22)	s(1)	Pesintä varmistettu Inarin Lapissa kerran: lintuatlas 2006–2010 ruutu 766:353 Inari, Reposaari, pesimävarmuus 73.
Lapinpöllö	ss/hp	s	1980- ja 1990-luvuilla lapinpöllöstä tehtiin paljon enemmän havaintoja kuin 2000-luvulla (2000–2016) ja asuttuja pesiäkin löydettiin kymmenkunta. Tämän jälkeen on ilmoitettu vain yksi pesintä, hyvänä sopulivuonna 2011 Vätsärin erämaassa (Sammakkoniemi). Viime lintuatlaksessa (2006-2010) lapinpöllö tavattiin vain kahdessa Inarin ruudussa, Utsjoelta ei havaintoja tehty. Kevättalvella 2020 Inariin ulottui lapinpöllön vaellus. Havaintoja kertyi yhteensä 32.
Sarvipöllö	s/hhp(13)	s(1)	Inarissa pesintä varmistettu 6 kertaa: Ivalo 1931, Ivalo 1991, Alajärvi 2011, Inarin kirkonkylä 2015, Ivalo 2016, Rajajoosseppi 2019. Utsjoella tavattu kerran: 14.3.2016 1 löytyi kuolleena Karigasniemestä.
Suopöllö	mhp	mhp	Myyrävuosina yleisempi.
Helmipöllö	hp	hhp	Myyrävuosina yleisempi, esim. Ivalon ympäristöstä löydettiin myyrävuonna 2014 neljä pesää.
Kehräätä	s(2)		16.7.1987 1 Inari, Sovintovaara. 2.6.2003 1 k Inari, Riekkovaara.
Tervapääsky	hp	s/hhp	Pesii harvinaisena Inarin erämaa-alueiden vanhoissa mäntymetsissä. Utsjoella pesintä varmistettu lintuatlaksessa 2006–2010 Suomen pohjoisimmassa ruudussa, Nuorgam 777:353, pesimävarmuus 70. Kevät- ja syysmuutolla suurehkoja määriä tavataan Ivalojoensuulla ja Mellanaavalla: esim. 14.6.1998 43 p Ivalojoensuu, 3.6.2019 62 Mellanaapa, 10.8.2022 42 Mellanaapa. Utsjoelta ilmoitettu vain 9 havaintoa (22 yksilöä) 2000-luvulta.
Mehiläissyöjä	s(3)	s(2)	*22.6.1986 1 Utsjoki, Kevojoensuu. 24.5.2009 1 p Inari, Kaamanen. 26.5.2009 1 p Inari, Nanguniemi. *4.6.2015 1 p Utsjoki, Buolžaboatka ("Sopuliharju"). 7.5.2016 1 p Inarin kirkonkylä, Varissaari. *9.6.2020 1 p Näätämä, Nuortijoki.

Harjalintu	ss(>40)	ss(>20)	Harjalintuja tavataan yleensä syys-lokakuussa, keväältä (touko-kesäkuu) havaintoja on tiedossa vain 7.
Käenpiika	hp	hp	Vuositaitin havaitaan vain muutamia yksilöitä. Esim. vuonna 2019 Inari 3, Utsjoki ei yhtään, 2020 Inari 5, Utsjoki 1, 2021 ei yhtään, 2022 Inari 2, Utsjoki 2.
Harmaapäätikka	ss	s(10)	Vuoteen 1998 mennessä harmaapäätikkästä oli tiedossa Inarin Lapista vain yksi havainto. Havaintoja on tämän jälkeen 2000-luvulla kertynyt runsaasti. Jo vuonna 2004 ilmoitettiin 27 havaintoa (15–18 yksilöä). Samana vuonna ilmoitettiin Utsjoelta ensimmäiset havainnot. Tämän jälkeen laji on Utsjoella tavattu 2015–2016 Kevon tutkimusasemalla ja 2019, 2020, 2022 Karigasniemessä ja 2022 Kirkkonylässä.
Palokärki	ss/hp	s(6)	Joinakin vuosina palokärjellä on selvää vaellusta, jolloin se on Inarissa runsaampi: esim. vuonna 2014 siitä tehtiin 81 havaintoa. Utsjoelta palokärjestä on ilmoitettu vain muutamia havaintoja. Lintuatlaksissa ei lajia ole Utsjoella tavattu.
Käpytikka	mhp	ss/(hnp?)	Vaellusvuosina runsaampi. Esim. vuonna 2013, Inarista ilmoitettiin 144 havaintoa (284 yksilöä) ja Utsjoelta 10 havaintoa (16 yksilöä). Vuosi 2022 oli Inarissa myös ennätysellinen (181 havaintoa/472 yksilöä). Utsjoelta ei ole tiedossa varmistettuja pesintöjä, mutta lintuatlaksessa 2006–2010 todennäköinen pesintä kahdessa ruudussa.
Valkoselkätikka		s(1)	Havainto on vuosien 1986–89 lintuatlaskartassa, Karigasniemen ruudussa 770:45. Atlaslomakkeen mukaan lintu on tuolloin havaittu kevättälvellä 1987 kaksi kertaa.
Pikkutikka	hp	hp	Viihtyy etenkin jokivarsien lehtevissä rantametsissä, joissa on runsaasti lahoppua.
Pohjantikka	mhp	hp	Suosii kuusivaltaisia metsiä (esim. Kutturantien Köysivaara), mutta viihtyy myös vanhoissa luonnonalaisissa mäntymetsissä, missä merkkeinä oleskelusta ovat kaarnakasat kelojen ja kuolleiden mäntyjen tyvillä.
Lyhytvarvaskiuru	s(1)	s(1)	*25.5.2009 1 p Ivalon Mellanaapa. *23.6.–15.7.2011 1 p Utsjoki, Karigasniemi, Ailikkaan erotuspaikka.
Töyhtökiuru	s(1)		*7.8.2007–27.6.2008 1 p Inari, Kirkkonylä. Kirkkonylän keskustassa pitkään oleskellut peloton töyhtökiuru tuli tutuksi hyvin monille kyläläisille.
Kiuru	hp/hnp	hnp	Kiurun vakituksimpia esiintymispaikkoja ovat olleet Ivalon ympäristön pellot, lentokentän alue ja Mellanaapa. Kesäaikaisia havaintoja on myös Kaunispaän, Karigasniemen Ailikkaan ja Utsjoen Ailikkaan tunturialueilta.
Tunturikiuru	ss/(hnp?)	ss/(hnp?)	Viimeisin pesintä Suomessa on varmistettu Inarin Kaunispaällä vuonna 2001. Tämän jälkeen muutamia pesimäaikaisia havaintoja yksittäisistä laulavista linnuista Kaldoaivin ja Paistunturin erämaa-alueilla. Tavattu 2000-luvulla seitsemänä keväänä Ivalon Mellanaavalla, 1.-18.5. välillä. Syyshavaintoja on tiedossa vain kolme. Myöhäisin *12.-13.11.2018 3 p Inari, Törmänen.
Törmäpääsky	hp/mhp	hp/hnp	Kanta on taantunut. Näin on käynyt mm. suurimmalle tunnetulle kolonialle Ivalojokisuun Nirvamellassa: jokitörmässä pesi 2000-luvun alussa arviolta 50-100 paria, mutta 2021 paikalla tavattiin enää 5-6 paria. Osin kannan taatuminen johtuu myös sora- ja hiekkamonttujen tiukentuneista maisemointivaatimuksista. Teno-, Inari-, Ivalo- ja Näätämojokivarsista on tiedossa muutamia pieniä pesimäyhdyskuntia.
Haarapääsky	hp	hnp	Suurimmat määrät kevätmuutolla 5.6.2010 30 p Alempi Akujärvi, 26.5.2007 15 p Mellanaapa ja syysmuutolla 10.8.2013 60 p Alempi Akujärvi, 6.8.2015 40 p Mellanaapa.
Ruostepääsky	s(2)		*6.6.2011 1 Kaamanen. *27.5.2012 1 Ivalo, Mukanperäsaari.
Räystäspääsky	mhp	hp	Suurimpia määriä keväällä ja syksyllä: 12.8.1996 45 p Inari, kirkkonylä, 5.6.2010 50 p Alempi Akujärvi ja 18.8.2011 50 m Ivalo, Mukanperä. Kevon kanjonin muutamilla pahoilla asustelelee pieniä pesimäyhdyskuntia luonnonympäristössä.
Metsäkirvinen	myp/mhp	hp	Inarin pohjoisosissa metsäkirvinen on jo harvalukuinen. Lintuatlaksessa 2006–2010 se havaittiin Utsjoella vain kolmella ruudulla (1 varmistettu pesintä, 2 todennäköistä) ja muitakin havaintoja Utsjoelta on kertynyt vähän.
Taigakirvinen	s(2)		*26.9.2019 1 p Mellanaapa. *28.8.2022 1 p Peltolaivi, Honkavuoman latva.
Niittykirvinen	yp	yp	
Lapinkirvinen	hp	mhp	Tunturi-Lapin laji, joka suosii pesimäympäristönä reheviä pajukkoita. Muutolla säännöllisesti Ivalon Mellanaavalla elokuussa. Tunnetuimmat esiintymispaikat ovat Utsjoen Karigasniemen Piesjäntä ja Luopmošohjeaggi, Väisjeaggi ja Pulmankijärven tienvarren suoalueet. Viime vuosina lapinkirvisen kanta näyttää näillä soilla taantuneen, paikoin jopa hävinneen kokonaan.
Luotokirvinen	s(5)	s(1)	1.–5.8.1986 1 Inari, Vasikkaselän saaret. 30.3.2002 1 Utsjoki, Kevon tutkimusasema. *28.4.2015 1 Inari, Kettujoki. *8.4.2020 1 Inari, Kettujoki. *26.4.2020 1 Inari, Kettujoki. *16.10.2020 1 Inari, Pahtaniemi.

Nummikirvinen	s(1)		*30.5.2017 1 Inarin kirkonkylä, kalasatama.
Keltavästäräkki	myp	myp	
Sitruunavästäräkki	s(1)		*9.–15.6.1996 1 k Inari, Repojoki, tienvarren pellot. *5.-6.5.2020 kn Mellanaapa.
Virtavästäräkki	ss/hhp	s	Tavataan melko säännöllisesti Saariselällä (mm. Luttojoen latvalla, hissirinteiden alapuolella ja Laaniojalla), Kiilopäällä (Tunturikeskus/Kiilo-oja) ja Lemmenjoen kansallispuistossa (useimmat Ravadaskönkällä).
Västäräkki	myp	myp	Motacilla alba yarrellii *17.4.2022 1 p Mellanaapa.
Tilhi	myp/mhp	mhp	Suurin määrä: 1.11.2012 6000 marjomassa pihlajissa Ivalon keskustassa ja samana päivänä talvilintulaskentareitillä Ivalo-Koppelo 3180 tilheä. 28.10.2014 1100 Ivalo, kunnantalon pihlajissa.
Koskikara	mhp	mhp	Talvella Juutuan Jurmukoskelle kerääntyy kymmeniittäin koskikaroja. Joskus niitä voi nähdä samalla koskella jopa yli 40 sukeltelemassa hyiseen virtaan. Juutuan muilla koskilla, esim. Alakoskella ja Ritakoskella, näkyy kerrallaan yleensä vain muutamia karoja.
Peukaloinen	hhp	hhp	Peukaloisen vakituksia esiintymispaikkoja on Inarin Lapista tiedossa vain muutama: Kevon kanjoni, Lemmenjoen kansallispuisto (Kultahaminan lehto ja Vajokilaakson kanjoni) sekä Sarmitunturin erämaan Sarmikuusikko, josta tehtiin vuonna 2000 ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa tiedossa oleva pesälöytö.
Rautiainen	mhp	mhp	Rautiainen on kuusimetsien laji, mutta Utsjoella sitä tavataan harvakseltaan myös jokivarsien koivumetsissä, esim. Tenojoen ja Utsjoen laaksoissa sekä Kevon kanjonissa.
Punarinta	mhp	mhp	Esiintyy rautiaisen tavoin kuusimetsissä, mutta rautiaista useammin myös mäntyvaltaisissa sekametsissä. Utsjoella jokilaaksojen koivumetsissä kuten rautiainen.
Sinirinta	myp	myp	
Sinipyrstö	s/hhp?(19)	s(10)	Venäjän taigan laji. Toukokuun lopun lämpötilat näyttävät vaikuttavan siihen, kuinka paljon sinipyrstöjä muuttoaikana maahamme idästä saapuu. Lämpimien keväiden ansiosta todettiin vuosina 2009–2010 ennennäkemättömän voimakas sinipyrstöinvaasio. 2010 invaasio ulottui Inarin Lappiin asti, jossa tavattiin 7 laulavaa, eteläisimmät Saariselän lisakkipäällä ja pohjoisin Utsjoen Pulmankijärvellä.
Mustaleppälintu	s(4)	s(4)	12.6.2005 1 n-p Utsjoki, Gáimmoaivi. 22.8.2012 1 n-p Kaunispää. 6.6.2013 1 k Utsjoki, Skállovárri. *22.10.2019 2 n-p, toinen itäinen, punavatsainen värimuoto, Juutuanvuono, Mutustelemaniemi. *14.6. 2020 2kv k Utsjoki kk, Saamen silta. *6.4.2021 +2kv k Kirvelijärvenvaara ja mahdollisesti sama lintu *7.-8.4.2021 Mellanaapa. *17.-30.6.2021 1 k Utsjoki, Karigasniemi, Ailigas. 26.5.-13.7.2022 1 k Karigasniemi, Ailigas. 22.6.2022 1 k Utsjoki, Tanssijoki.
Leppälintu	myp	myp	Kuivien mäntykankaiden tyyppilaji. Esiintyy harvalukuisena myös Tunturi-Lapissa puustoisimmissa tunturikoivikoissa, jossa kolojen puuteessa pesii maamättäisiin.
Pensastasku	myp/mhp	hp	Utsjoelta ilmoitetaan useimpina vuosina enintään muutamia havaintoja. Vuonna 2022 Tiirassa kaksi: laulava koiras Piesjängällä ja Korretojalla.
Sepeltasku		s(2)	*14.7.1992 Utsjoki Aittijoki pesintä. Sepeltasku/mustapäätasku (Saxicola maurus/rubicola) *13.6.1976 1 k Utsjoki, Kaldoaivin erämaa, Guorboaivi.
Kivitasku	myp	myp	Kivikkoisten tunturipaljakoiden ja hakkuualueiden tyyppilaji. Pesivänä myös avoimissa ja valoisissa männikoissä. Viime vuosina kivitaskun kanta on selvästi taantunut.
Sepelrastas	ss/hhp	hhp	Pesii Kevon kanjonissa ja muutamilla Tenojoen laakson jyrkillä kalliopahdoilla. Kevätmuutolla säännöllisesti (23.4.–11.5.) Ivalon Mellanaavan jätevedenpuhdistamon alueella, jossa esim. vuonna 2015 tavattiin samanaikaisesti 7 yksilöä.
Mustarastas	ss	ss	Viime vuosina mustarastas näyttää runsastuneen Inarin Lapissa ja siitä on tehty vuosittain 12–36 havaintoa. Suurin osa havainnoista huhtikuussa ja syys-lokakuussa. Kesäaikaisia havaintoja on tiedossa vähän; laulavia tavattu vain muutaman kerran, eikä pesintää ole vielä Inarin Lapissa varmistettu.
Mustakaularastas	s(3)		*23.–30.10.2015 1kv n Ivalo, Salmenranta. *4.12.2019 1kv k Inari, Akujärvi ja sama lintu edelleen *24.1.-9.4.2020 Inari, Ivalo Ilvestie. *27.10.-2.11.2012 1kv k Ivalo, Salmenranta, risteymän mahdollisuutta ei ole voitu täysin poissulkea. *10.12.2019 1kv n Inari, Ivalo, risteymä mustakaularastas X punakaula-/ruoste-/ruostesiipirastas.

Räkättirastas	yp	yp	
Laulurastas	myp	mhp	Kuusivaltaisten metsien tyyppilaji, mutta esiintyy myös koivumetsissä, esim. Tenojoen ja Utsjoen laaksokoivikoissa.
Punakylkirastas	yp	yp	
Kulorastas	mhp/myp	hhp	Viihtyy jäkäletyypin vanhoissa mäntymetsissä, joiden tyyppilaji se on yhdessä harmaasiepon, leppälinnun ja järripepon kanssa. Utsjoella kulorastas on harvinainen: viimeisimmässä lintuatlaksessa (2006–2010) se havaittiin kolmessa ruudussa. Vuonna 2019 Tiiraan ilmoitettiin Utsjoelta yksi havainto, vuonna 2020 neljä havaintoa.
Kirjorastas	s(1)		*29.9.2017 1 Ivalo, Salmenranta.
Kultarinta		s(3)	Kolmena kesänä (1979, 1983 ja 1992) laulava Utsjoella Kevojärvellä, Tsarsejoensuun lehdossa.
Ruokokerttunen	mhp/hp	mhp/hp	
Viitakerttunen	s(2)		22.6.1985 1 Ä Karhujärvi (7679:497). 29.6.1985 1 Ä Opukasjärvi.
Luhtakerttunen	s(2)	s(1)	19.6.2010 1 Ä Utsjoki Nuorpiemi. *14.8.2018 1 rengastettu Inari, Mellanaapa. 1.9.2020 1 Siggavuono (Sikovuono).
Rusorintakerttu	s(1)		*16.5.2009 1k Ä Inari, Mustola, Sarmijärven kalanviljelylaitos.
Hemekerttu	ss	s(11)	Inarissa vuosittain 4 - 6 laulavaa. Utsjoella 2000-luvulla seitsemän kertaa, joista neljä vuonna 2022.
Pensaskerttu	s(1)		30.6.1997 1 Ä Ivalo.
Lehtokerttu	hhp	hp	Utsjoella rehevien jokivarsilehtojen (Tenojoki, Vetsikkojoki) harvalukuinen pesimälintu. Inarissa melko säännöllisesti Lemmenjoen kansallispuistossa Kultahaminan lehdossa, jossa enimmillään ollut 3 laulavaa.
Mustapääkerttu	ss	s	Inarissa tavataan useita yksilöitä vuosittain syys-lokakuussa, joskus vielä joulukuussakin. Enimmät Ivalon Salmenrannassa, jossa varhaisin 4.9.2013 ja suurin yhdellä kertaa nähty määrä 29.10.2014 3 k 2 n. Esiintyminen liittyy mustapääkertun Euroopassa laajalti todettuun siirtymiseen syksyllä pesimäalueilta mm. luoteeseen ja kauas pohjoiseen, Islantia ja joskus Jäämeren saaria myöten. Kesäaikaisia havaintoja on 2000-luvulta tiedossa Inarista vain viisi, Utsjoelta yksi.
Idänuunilintu	s(9)	s(4)	Utsjoen havainnot: 22.6.2013 1 Ä Nuvvos, Suohpanjárga. 12.6.2020 1Ä Kaldoaivi, Pulmankijoen W-ranta. 3.7.2020 1Ä Dorkanjunni. 8.7.2020 1Ä Utsjoki Kk, pumppuamo.
Lapinuunilintu	hp	hp	Suosii etenkin jokivarsien koivikkolehtoja.
Hippiäisuunilintu	s(1)		*6.10.2003 1 Ivalo Salmenranta.
Taigauunilintu	s(10)	s(4)	Inarin havainnoista 1 elokuulta, 6 syyskuulta, varhaisin 11.9.2013, 3 lokakuulta, myöhäisin 31.10.1998. Havainnoista 5 samalta paikalta Ivalon Salmenrannasta. Utsjoelta neljä havaintoa (1993, 2013, *2016 ja 2019), joista 16.9.1993 1 rengastettu, Kevo - tiittävästi koko Lapin ensimmäinen havainto lajista.
Sirittäjä	ss/hhp	s	Sirittäjän pesintä on varmistettu muutaman kerran Lemmenjoen kansallispuistossa, Kultahaminan lehdossa.
Tiltaltti	hp	hp	Phylloscopus collybita tristis: *17.6.2017 1Ä Inarijärvi, Mahlatti. *12.6.2018 1Ä Ivalo, Mukanperä, Salmenranta. *9.8.2018 1Ä Rajajooseppi. *7.6.2019 1 Ä Inari, Köysivaara. *17.6.2020 Ä Ivalo Mukanperä, Salmenranta. *30.6.2020 Ä Inari Hirviniemi.
Pajulintu	yp	yp	
Hippiäinen	hhp	s	Hyvin harvalukuisena alueen kuusimetsissä, esim. Kutturin tien Köysivaara, Sarmitunturin erämaa (Sarmikuusikko) ja Lemmenjoen kansallispuiston Iso Nirroselkä-Rämeselkä.
Harmaasieppo	mhp	hp	
Sepelsieppo		s(1)	*16.6.2021 k + 1kv p Utsjoki kk , Lly:n ensihavainto lajista.
Kirjosieppo	myp	mhp	
Pyrstötiainen	ss/hhp	ss/hhp	Vuosina 2012–2015 pyrstötiainen oli Inarin Lapissa poikkeuksellisen runsaslukuinen aiempiin vuosiin verrattuna. Myös pesimishavaintoja tehtiin. Inarista kirjattiin yhteensä 268 pyrstötiashavaintoa (1519 yksilöä) ja Utsjoelta 22 (139). Utsjoelta oli tätä ennen tiedossa vain kymmenkunta havaintoa. Vuonna 2017 lajista kirjattiin enää vain yksi havainto ja vuonna 2018 kaksi. Tämä jälkeen havainnoissa oli pientä kasvua vuosina 2019 - 2020, mutta vuonna 2022 laji oli jälleen kateissa.

Sinitiainen	mhp	hp	Sinitiainen asettui Ivaloon v. 1989. Talviruokinnan ansioista se on levittäytynyt koko pohjoisimpaan Lappiin, aina Nuorgamiin asti.
Talitiainen	myp	myp	
Kuusitiainen	ss	s(6)	Muutama kuusitiainen tavataan Inarissa yleensä vuosittain. Lajilla oli erittäin voimakas vaellus vuosina 2014–2015, jolloin Inarissa tavattiin ennätykselliset 40–50 kuusitiaista. Utsjoelta ei vuoteen 1999 mennessä ollut tiedossa yhtään havaintoa. Tämän jälkeen on ilmoitettu 6 havaintoa.
Töyhtötiainen	s(14)	s(2)	Utsjoen havainnot: Marraskuu 1989 1 kirkonkylä, 3.12.2008 1 Vanha Karigasniemi
Hömötiainen	mhp	mhp	
Lapintiainen	myp/mhp	mhp	
Pähkinänakkeli	ss	s	Suurimmat vaellusvuodet: 1976–77 (Inari 9 yksilöä, Utsjoki 2 yksilöä), 1983-84 (Inari 21, Utsjoki 2), 1995 (Inari 13, Utsjoki 3). Vuoden 1995 vaellus oli koko Suomessa suurin koskaan tunnettu. Vuosina 2000-2020 14 yksilöä tavattiin Inarin Lapissa, joista yksi Utsjoella.
Puukiipijä	ss/hhp	s(2)	Havaitaan yleisimmin syys-lokakuussa. Pesintä varmistettu kerran Inarissa: lintuatlas 2006–2010, ruudussa 762:345, Lemmenjoen kansallispuisto, Ravadasjärvi. Utsjoelta on tiedossa kaksi havaintoa: 8.10.1989 1 Vetsijokisuu ja 15.9.2013 2 Kenesjärvi.
Kuhankeittäjä	s(1)		*25.5.1986 1 ad k Ivalo, Pikku-Petsamo.
Pikkulepinkäinen	s(6)		
Isolepinkäinen	mhp	mhp	
Närhi	hhp	ss	Joinakin vuosina selvää vaellusta, jolloin yleisempi. Ivalon ympäristön kuusimetsissä on pieni vakituinen kanta.
Kuukkeli	mhp	mhp	
Harakka	mhp	mhp	Suurimpien kylätaajamien ympäristöissä yleinen.
Pähkinähakki	ss	s	Syksyn 1995 ennätysmäiseltä vaellukselta tiedossa 29 yks. Inarista ja 1 Utsjoelta.
Naakka	ss	s(9)	
Mustavaris	ss	s(6)	Inarissa tavataan vuosittain muutamia yksilöitä, yleensä huhtikuussa. Syyshavaintoja on tiedossa vain kaksi. Utsjoelta 2000-luvulta on tiedossa vain kaksi havaintoa: 19.5.2008 1 ad p Välimaa. 3.6.2021 1 ad p Nuorgam.
Varis	mhp/myp	mhp	
Korppi	mhp	mhp	Kerääntyvät joskus suuriksi parviksi poroerotuspaikojen teurasjätemontuille: esim. Utsjoella 16.12.2006 100 p Karigasniemi, Ailikas ja 19.12.2012 90 p Skállovári.
Kottarainen	hhp	s	Ensimmäisessä lintuatlaksessa 1974–79 kottaraisen pesintä varmistettiin Inarista ja Utsjoelta useammasta ruudusta. Tämän jälkeen kanta taantui jyrkästi, eikä pesintää enää todettu v. 1993 jälkeen. Kanta on aallonpohjan jälkeen hieman elpynyt ja pesintöjään on jälleen todettu: uusimmassa lintuatlaksessa (2006–2010) pesintä varmistettiin kahdessa Inarin ruudussa ja v. 2015 Ivalon Mellanaavalla pesi 2 paria onnistuneesti, mutta ei sen jälkeen.
Punakottarainen	s(4)	s(1)	*7.–11.6.1971 1 Utsjoki, Karigasniemi. *28.6.1971 1 Inari, Jääjärvi. *4.6.1998 1 Inari, Mellanaavan jätevedenpuhdistamo. *22.–25.6.2012 1 Ivalo keskusta (valokuvattu). *23.7.-3.8.2021 1 Inari, Akujärvi.
Varpunen	mhp	mhp	
Pikkuvarpunen	hhp	ss/hhp	Havaintojen määrä kasvoi 2000-luvulla, jolloin laji runsastui koko Suomessa. Nykyään jo monien talviruokintapaikkojen vakiovieras. Viitteitä pesinnästä ovat havaitut nuoret linnut. Myös pikkuvarpusen ja varpusen risteymiä on havaittu.
Peippo	mhp	hhp	Peippo on Ivalon ja Inarin kirkonkylän ympäristössä melko yleinen, muualla Inarissa harvalukuinen. Utsjoella pesintä on varmistettu lintuatlaksissa vain kerran (776:351 Vetsikko). Utsjoelta Tiiraan on ilmoitettu 2000-luvulla 1 - 8 havaintoa vuosittain.
Järripeippo	yp	yp	
Viherpeippo	mhp	mhp	Ensimmäinen julkaistu tieto lajista Inarin Lapissa on vasta vuosien 1974–79 lintuatlaksessa, jolloin viherpeippo tavattiin yhdellä ruudulla Ivalon alueella. Sitten lintujen talviruokinnan ansiosta laji on levittäytynyt pesivänä Nuorgamiin asti. Kanta taantui Trichomonas gallinae-alkueläimen aiheuttaman epidemian takia, mutta on viime vuosina osoittanut elpymisen merkkejä.
Tikli	s(8)	s(4)	Lintuatlaksessa 2006–2010 pesintä heinäkuussa 2009 ruudussa 767:350 Inari, Tuuruharju, pesimävarmuus 70.

Vihervarpunen	mhp	hp	Vihervarpusen kannanvaihtelut ovat suuria; joinakin vuosina paikoin runsaslukuinen.
Hemppo	s(15)	s(1)	Utsjoelta hemposta on vain hyvin vanha Jacob Fellmanin ilmoittama tieto 1800-luvulta.
Vuorihemppo	ss	s(15)	Suomen toinen varmistettu pesintä todettiin vuonna 1987 Inarin pohjoisosassa, Isonkivennukan alueella (774:55).
Urpainen	myp	myp	Urpaisen vuosittaiset kannanvaihtelut ovat suuria
Tundraurpiainen	hp	mhp	
Kirjosiipikäpylintu	hp/hhp	s(14)	Kuusimetsien laji. Kutturantien Köysivaara ja Sarmikuusikko ovat olleet varmimpia paikkoja lajin löytämiseen. Kuusen siemensadon runsaudesta johtuvat vuosittaiset kannanvaihtelut ovat suuria.
Pikkukäpylintu	mhp/hp	hhp	Kuusen siemensadon runsaudesta johtuvat vuosittaiset kannanvaihtelut suuria.
Isokäpylintu	myp/hp	hp	Männyn siemensadon runsaudesta johtuvat vuosittaiset kannanvaihtelut suuria.
Punavarpunen	s(19)	s(1)	Utsjoen ainoa havainto: kesäkuussa 1968 laulava Karigasniemellä.
Taviokuuma	mhp	mhp	Suurimmat määrät: Inari 4.4.2019 70 p ruokinnalla Tirro, Utsjoki 17.3.2022 27 p ruokinnalla Gorretat.
Punatulkku	mhp	hp	
Nokkavarpunen	ss	ss	Pistäytyy yleensä huhti-toukokuulla lintujen ruokintapaikoilla.
Lapinsirkku	hp/mhp	mhp/myp	Tunturi-Lapin laji. Suurimmat tiheydet yleensä palsasuoalueilla, esim Utsjoen Piesjängällä.
Pulmunen	hp	mhp	Keväällä (28.4.–8.5.) 2014 Utsjoen Tenojokivarressa (Välimaa-Sirma) havaittiin Inarin Lapissa ennen näkemättömän suuri pulmusparvi, jossa oli arviolta 8000–10000 yksilöä!
Keltasirkku	mhp/hp	ss/hhp	Pieni pesimäkanta Ivalon, Inarin ja Nellimin kylien ympäristöissä.
Mäntysirkku	s(2)		*4.11.2016 1 k löydetty kuolleena Ivalon keskustasta. *19.-26.10.2019 1 k Ivalo, Männiköntie ja todennäköisesti sama yksilö *26.10.-1.11.2019 1 k Ivalo, Salmenranta.
Peltosirkku	s(8)	s(2)	27.5.1983 1 k Å Utsjoki, Aittijoki, 2.-6.6.1987 1 n Utsjoki, Korretoja. Ivalosta kaksi erittäin myöhäistä havaintoa, 2.11.1996 ja 18.10.2008. Ensimmäinen mainittu on tietävästi kaikkien aikojen toiseksi myöhäisin havainto Suomesta. Lintu kuoli, ja on taltioituna.
Pohjansirkku	hp	s/hhp	Pohjansirkun kanta on taantunut jo pitkään. Viime vuosina (2019-2022) havaintoja on kirjattu paljon ja kanta näyttää runsastuneen. Utsjoella pesintä on varmistettu vain kerran: lintuatlas 2006-2010 ruutu 776:351, Vetsikko. Laji suosii pesimäympäristönä kuusivaltaisia rämeitä ja korpia, esim. Inarissa Sarmikuusikon alue ja kunnan lounaisrajalla Inari-Kittilä tien varrella Lauttaselkä-Mirhaminmaa.
Pikkusirkku	hp	s/hhp?	Pikkusirkun pesimäympäristöä ovat isovarpuset mäntyrämeet. Lajin tunnetuimmat esiintymispaikat ovat Ivalon Pikku-Petsamon Neitiaapa, Jänkkäjärven ympäristö (enimmillään kummassakin 4 paria) ja Mellanaapa (1-2 paria).
Mustapääsirkku	s(1)		*14.–16.6.2016 1 k Inari, Ahkioniemi.
Kultasirkku	s(1)		14.6.1995 1 k Å Inari, Sammuttijärvi.
Pajusirkku	myp	myp	
Harmaasirkku	s(3)	s(2)	10.7.1951 1kn Ivalo. *18.-19.6.2012 1 k Utsjoki, Nuorgam. *12.-19.5.2015 1 Ivalo, Salmenranta. *13.5.-1.6.2020 1 p Utsjoki, Vetsikko. *24.5.2020 1 p Ivalo, Pahtaoja

Edellä esitetyt tiedot perustuvat tekijöiden omien ja muilta alueen lintuharrastajilta saatujen havaintojen lisäksi seuraaviin julkaisuihin ja tiedostoihin:

Iso-livari, Lasse. 2006: Birds of Inari Lapland (Published observations). - Kevo Subarctic Research Institute, University of Turku.

Karhu, Heikki & Osmonen, Olli. 2000: Inarin Lapin linnut. Faunistisia lintutietoja Inarin Lapista, erityisesti vuosilta 1985-1999. - Kokko 15: 3-126.

Tiira - lintutietopalvelu, www.tiira.fi

Valkama, Jari, Vepsäläinen, Ville & Lehikoinen, Aleksi 2011: Suomen III Lintuatlas. – Luonnontieteellinen keskusmuseo ja ympäristöministeriö. ISBN 978-952-10-6918-5.

Lisätiedoissa käytetyt lyhenteet:

k = koirasyksilö

n = naarasyksilö

kn = pari

ad = aikuinen

juv = nuori

1 kv = samana kalenterivuonna syntynyt

2 kv = edellisenä kalenterivuonna syntynyt

+ 2kv = ennen edellistä kalenterivuotta syntynyt

2-3 kv = toisen-kolmannen kalenterivuoden lintu

3 kv = kolmannen kalenterivuoden lintu

n-p = naaraspukuinen

tp = talvipukuinen

jp = juhlapukuinen

vp = vaihtopukuinen

Ä = laulava

p = paikallinen

m = muuttava

N (pohjoinen), S (etelä), SE (kaakko), W (länsi), : ilmoittavat lentävän/muuttavan linnun etenemissuunnan

* = havainto on BirdLife Suomen Rariteettikomitean tai Lapin alueellisen harvinaisuuskomitean hyväksymä

Lajiluettelo on julkaistu ensimmäisen kerran Inarin Lapin luonto- ja lintukohdeoppaassa 1997. Tämä päivitetty luettelo on laadittu 15.2.2023.